

Diario La Gaceta, Tucumán

22 de Noviembre de 2004

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/vernota.asp?id_seccion=8&id_nota=95940

El aborto es la principal causa de mortalidad materna en Tucumán

No se registra el 21% de los fallecimientos ocurridos en el embarazo, el parto y el puerperio.

Estudio estadístico realizado en seis provincias. La investigación impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación se presentará hoy en el Centro Cultural. Necesidad de reorientar las políticas sanitarias.

Tucumán está entre las provincias con mayor índice de mortalidad materna, y es la que cuenta con el mayor subregistro (cifras que no quedan registradas) de este tipo de mortalidad -el 21,1%- según un estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Los especialistas dividieron el país en regiones e identificaron las provincias con mayores índices de mortalidad: Tucumán, Mendoza, San Luis, San Juan, Formosa y Chaco. Se estudiaron allí las muertes maternas ocurridas en 2002. De 95 defunciones, las complicaciones ocasionadas por abortos constituyeron la primera causa de muerte. Mendoza lidera el ranking con el 35% de los casos. Le sigue Tucumán con el 21%. El estudio se desarrolló como iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación. La investigación se publicó en el libro "Para que cada muerte materna importe", que será presentado hoy, a las 11, en el Centro Cultural Virla.

El trabajo fue dirigido en Tucumán por Sofía Amenábar, docente de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNT. "Estudiamos las condiciones de salud de las mujeres del país, su riesgo reproductivo, la existencia de grupos vulnerables. Concluimos en la necesidad de que sean protegidos por la clase dirigente, que deberá reorientar las políticas de salud", analizó.

El trabajo continúa con la investigación de las muertes no institucionales (ocurridas fuera de clínicas u hospitales). "La tasa de mortalidad materna es de 4 por 10.000, una cifra importante. En Tucumán, el 21% de las muertes se da por abortos", indicó Amenábar. Luego vienen las hemorragias, la hipertensión o las sepsis. Según las conclusiones, entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, la búsqueda de atención médica ante las señales de alarma estuvo demorada, a diferencia de aquellas que fallecieron por otras causas. "El estigma asociado al aborto clandestino puede explicar esta demora", explica la médica.

Falta de medios

Los expertos sostienen en su informe que los factores que contribuyen a la muerte materna son múltiples y, en su gran mayoría, evitables. Uno de esos factores es la falta de medios para la comunicación, combinada con las dificultades de transporte del sistema de salud, que demoran el acceso a los servicios entre quienes residen en zonas rurales.

“También la falta de involucramiento del compañero en las decisiones reproductivas y la violencia contra la mujer”, que dificultan y a veces impiden adoptar prácticas para evitar embarazos no deseados, afirma la experta. En el mundo, las complicaciones durante el embarazo y el parto son responsables de un 18% de las enfermedades que sufren las mujeres entre los 15 y 44 años de edad. En América Latina y en el Caribe, más de 500.000 mujeres padecen problemas crónicos de salud como consecuencia de inadecuada atención del embarazo, parto y puerperio.

La prevención de la muerte materna se reconoce como una prioridad internacional, y nuestro país se ha comprometido a disminuirla.